高锰酸钾氧化去除水中三氯生动力学研究

徐勇鹏¹, 杨静琨^{1,2}, 王在刚³

(1.哈尔滨工业大学 城市水资源与水环境国家重点实验室, 150090 哈尔滨, xuyongpeng123@163.com;

2.华南理工大学 建筑设计研究院, 510640 广州; 3. 哈尔滨市国际工程咨询中心, 150018 哈尔滨)

摘要: 为了揭示高锰酸钾氧化去除水中三氯生的动力学规律, 通过烧杯试验研究得出高锰酸钾氧化三氯生的反应速率常数, 同时探讨高锰酸钾浓度、pH、温度等因素对反应速率常数的影响. 试验结果表明: 不同高锰酸钾浓度下, 三氯生能够被迅速氧化, 氧化三氯生的反应符合二级反应动力学, 二级反应动力学常数 $K = 0.3316 \text{ mL} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. pH 对反应速率常数有显著影响, 在 pH 为 5、7 时, K 分别达到最小值和最大值. 高锰酸钾氧化三氯生的反应速率随着反应温度的增加而增加, 该反应表观活化能 E_a 为 $32.35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 说明该反应在一般水处理条件下较容易发生. 高锰酸钾是一种快速、高效去除水中三氯生的氧化剂.

关键词: 高锰酸钾; 三氯生; 动力学; pH; 温度

中图分类号: TU991.2

文献标志码: A

文章编号: 0367-6234(2011)12-0048-05

Kinetics on triclosan oxidation by potassium permanganate in drinking water

XU Yong-peng¹, YANG Jing-kun^{1,2}, WANG Zai-gang³

(1.State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment, Harbin Institute of Technology, 150090 Harbin,

China, xuyongpeng123@163.com; 2.Architecture Design & Research Institute, South China University of

Technology, 510640 Guangzhou, China; 3. Harbin International Engineering Consulting

Center, 150018 Harbin, China)

Abstract: Jar tests were conducted to expose the kinetic law of triclosan oxidation by potassium permanganate in aquatic environment. The rate constant of the reaction was obtained, meanwhile, the factors influencing the value of K , such as potassium permanganate dosage, pH value and temperature, were investigated. The results showed that triclosan was rapidly oxidized by potassium permanganate in aqueous solution with different initial concentrations of potassium permanganate, and second-order reaction kinetics was observed between triclosan and potassium permanganate with second-order reaction rate constant $K = 0.3316 \text{ mL} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. The second-order reaction rate constant was influenced by pH values, and K reached its lowest and highest level at pH 5 and 7 respectively. The rate of oxidation increased with the temperature increasing, and the reaction activation energy $E_a = 32.35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, which revealed that the oxidation reaction between triclosan and potassium permanganate was feasible under usual water treatment condition. Therefore, potassium permanganate is a feasible oxidant which can removal the triclosan quickly and efficiently.

Key words: potassium permanganate; triclosan; kinetics; pH; temperature

三氯生(2,4,4'-三氯-2'-羟基二苯醚, Tri-

closan)作为一种广谱杀菌消毒物质,广泛应用于香皂、漱口水、化妆品、洗涤用品等个人护理品及塑料餐具、鞋等日常生活用品中.在医用器械的消毒以及纺织品出厂前的消毒、抗菌处理中也有应用.最近美国地质勘探局调查地表径流中新型有机污染

收稿日期: 2010-09-09.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51108118);

黑龙江省科技攻关项目(GB07C20202).

作者简介: 徐勇鹏(1976—),女,博士,副教授.

物的结果表明,三氯生的平均质量浓度为 0.14 $\mu\text{g/L}$,是最常发现的新型有机污染物之一.另有报道在城市污水、地表水,沉淀物中以及鱼中均检测到三氯生及其甲基衍生物^[1-4].三氯生的长期残留性、生物蓄积性和高毒性,易生成消毒副产物,且在光照和受热时容易形成二噁英,对生态系统安全和人体健康将产生严重的危害,已成为国内外水处理领域内研究的热点内容之一^[5-7].

高锰酸钾作为一种绿色的强氧化剂,可以有效控制水中的色度、臭味、消毒副产物^[8-10],同时是去除水中有机还原性污染物普遍采用的药剂,其工艺简单,可操作性较强,易于在水厂中实施^[11].本文对高锰酸钾氧化三氯生的过程进行了研究,测定了三氯生与高锰酸钾的反应速率常数,并探讨了高锰酸钾质量浓度、pH、温度等条件对降解过程的影响.

1 试验

1.1 试验装置

IDEA SCIENCE 公司生产的 MIXdrive 15 磁力搅拌器;安捷伦公司生产的型号 1200 高效液相色谱仪;雷磁 PHS-3C 精密 pH 计.

1.2 化学试剂

试验所用三氯生为色谱纯,由 Sigma Aldrich 生产,质量分数 99%),用去离子水(电阻率 $\geq 18 \text{ k}\Omega \cdot \text{m}$)配成 1 mmol/L 的储备液于棕色瓶中,使用时根据需要稀释;高锰酸钾及硫代硫酸钠(分析纯,质量分数大于 99.5%,购自天津市百世化工有限公司);用于配制缓冲溶液的磷酸盐、硼酸/硼砂(分析纯,质量分数大于 99%,购自天津市博迪化工有限公司);其他化学试剂均为分析纯.

1.3 试验过程

试验在 25 mL 琥珀色旋盖小瓶中进行,反应小瓶的温度控制在所需值,在水浴磁力搅拌器中连续中速搅拌.向每个小瓶中加入一定量 pH 缓冲液,保持溶液反应前后的 pH 值在所需范围.向含有 10 $\mu\text{mol/L}$ 的三氯生溶液中投加一定量的高锰酸钾,在设定的时间间隔取样,然后用硫代硫酸钠中止反应,样品经处理后进行分析.

1.4 试验方法

三氯生用高效 HPLC 检测,色谱柱采用 Zorbax XDB-C18 柱(色谱柱尺寸为 $\phi 4.6 \text{ mm} \times 250 \text{ mm}$,填充剂粒径为 5 μm),检测器采用 UV 检测器,波长为 220 nm,柱温为 30 $^{\circ}\text{C}$. 2 mol/L 的甲醇与乙酸流动相,组成体积比为 3:1,流速为

1 mL/min.进样量为 100 μL ,外标法测定^[1].

2 结果与讨论

2.1 高锰酸钾氧化三氯生的效果

在三氯生初始浓度为 10 $\mu\text{mol/L}$,温度为 21 $^{\circ}\text{C}$,pH=7 的条件下,考察高锰酸钾浓度对三氯生化速率的影响,氧化效果如图 1.

图 1 不同高锰酸钾浓度对三氯生化影响

如图 1 所示,高锰酸钾对三氯生的氧化去除效果非常明显.在高锰酸钾浓度为 100 $\mu\text{mol/L}$ 条件下,氧化 90 s 后,三氯生的浓度由 10 $\mu\text{mol/L}$ 下降到 1.757 $\mu\text{mol/L}$,去除率为 82.43%.随着高锰酸钾浓度的增加,三氯生的氧化降解速率加快.当高锰酸钾浓度为 125 $\mu\text{mol/L}$ 时,氧化 80 s 后,三氯生浓度已经低于检测限.当高锰酸钾浓度为 200 $\mu\text{mol/L}$ 时,氧化 50 s 后三氯生即低于检测限.

2.2 高锰酸钾浓度对反应速率的影响

高锰酸钾氧化三氯生的过程可以表示为

$$d[\text{triclosan}]/dt = -K \cdot [\text{triclosan}] \cdot [\text{KMnO}_4]. \quad (1)$$

式中: K 为反应速率常数, $\text{L}/(\text{s} \cdot \text{mol})$; $[\text{KMnO}_4]$ 为高锰酸钾浓度, mol/L ; $[\text{triclosan}]$ 为三氯生浓度, mol/L .

当高锰酸钾的浓度为其相对于三氯生 10 倍的情况下,可以认为在反应过程中高锰酸钾的浓度基本不变,因此可得

$$d[\text{triclosan}]/dt = -K \cdot [\text{KMnO}_4] \cdot [\text{triclosan}] = -K_{\text{obs}} \cdot [\text{triclosan}]. \quad (2)$$

令 $K \cdot [\text{KMnO}_4] = K_{\text{obs}}$ (K_{obs} 为假一级反应速率常数, s^{-1}),测定不同时间段目标物浓度的变化,可以求出 K_{obs} . 不同高锰酸钾浓度条件下,三氯生的氧化降解的假一级反应动力学方程拟合结果见图 2 和表 1.

将原有的二级反应整理得到了关于三氯生的假一级反应, K_{obs} 为伪速率常数. 将不同高锰酸钾浓度与假一级反应速率常数进行拟合,结果见图 3.

图 2 不同浓度高锰酸钾氧化三氯生拟合曲线

图 3 高锰酸钾浓度与假一级反应速率常数的关系

表 1 不同高锰酸钾浓度条件下高锰酸钾氧化三氯生反应动力学参数

高锰酸钾浓度/($\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	拟合方程	$K_{\text{obs}}/\text{s}^{-1}$	$K/(\text{L} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	R^2
100	$\ln c = -0.0261t + 2.4724$	0.0261	261	0.8896
125	$\ln c = -0.0336t + 2.3311$	0.0336	336	0.9989
150	$\ln c = -0.0395t + 2.3439$	0.0395	395	0.9838
175	$\ln c = -0.0511t + 2.4610$	0.0511	511	0.9989
200	$\ln c = -0.0588t + 2.4724$	0.0588	588	0.9957

从图 3 可以看出,高锰酸钾浓度从 $100 \mu\text{mol/L}$ 增加到 $200 \mu\text{mol/L}$ 的过程中,假一级反应速率常数从 0.0261 s^{-1} 增加到 0.0588 s^{-1} .高锰酸钾初始浓度和假一级反应速率常数存在线性关系,拟合为

$$K_{\text{obs}} = 0.0003316[\text{KMnO}_4] - 0.00792. \quad (3)$$

式(3)表明假一级反应速率常数随高锰酸钾浓度的增加而线性增加,说明高锰酸钾氧化三氯生的反应是二级反应,二级反应速率常数 $K = 0.3316 \text{ mL} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.高锰酸钾氧化三氯生的本质是在液相中,高锰酸钾分子和三氯生分子发生有效碰撞,发生氧化反应,将三氯生氧化成其他物质,进而达到去除水中三氯生的目的.提高高锰酸钾投加浓度实质上提高了单位反应体积内的高锰酸钾分子数量,高锰酸钾分子数量的增加会使单位时间内高锰酸钾分子和三氯生分子发生有效碰撞的几率增加,反应速率也会随之提高.

2.3 pH 对反应速率的影响

在三氯生初始浓度为 $10 \mu\text{mol/L}$,高锰酸钾浓度为 $100 \mu\text{mol/L}$,温度为 $21 \text{ }^\circ\text{C}$ 的条件下,试验考察了 pH 为 4~9 时反应速率的变化规律,pH 值对反应速率的影响如图 4、表 2 所示.从图 4 可以看出,pH 是影响反应速率的重要因素.在 $\text{pH} < 5$ 时,反应缓慢,在 $\text{pH} = 5$ 时反应速率常数 K 达到最小; pH 为 5~7 时,反应速率常数 K 随着 pH 的增加快速增加,在 pH 为 7 时达到最大值.pH 继续

提高,反应速率常数 K 随 pH 的增大开始缓慢降低.可见在弱酸性水中三氯生的氧化反应相对比较慢,而在弱碱性条件下要迅速得多.这与马军等^[5]的研究结果趋势相同.目前,pH 对高锰酸钾氧化三氯生的影响还没有合理的解释,本文推测出现上述结果的主要是因为在不同 pH 条件下,高锰酸钾多变的氧化还原电位以及高锰酸钾被还原生成的产物不同导致.

图 4 不同 pH 条件下高锰酸钾氧化三氯生拟合曲线

高锰酸钾在酸性条件下具有很强的氧化性,其标准氧化还原电位 $E_0 = 1.51 \text{ V}$,反应式为

高锰酸钾在中性溶液中的氧化性要比在酸性条件下差得多,其标准氧化还原电位为 $E_0^0 = 0.588 \text{ V}$.反应式为

高锰酸钾在碱性溶液中的氧化性也较低

($E_0^0 = 0.564 \text{ V}$).但试验发现高锰酸钾在中性条件下氧化三氯生的速率远比酸性条件和碱性条件下大.

比较式(4)、(5)可知,与酸性条件下不同,高锰酸钾在中性条件下的最大特点是反应生成二氧化

化锰,由于二氧化锰在水中的溶解度很低,便以水合二氧化锰胶体的形式由水中析出.正是由于水和二氧化锰胶体的作用,使得高锰酸钾在中性条件下氧化三氯生具有很高的反应速率^[12].

表 2 不同 pH 条件下高锰酸钾氧化三氯生反应动力学参数

pH	拟合方程	$K_{\text{obs}}/\text{s}^{-1}$	$K/(\text{L} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	R^2
4	$\ln c = -0.0015t + 2.1722$	0.0015	15	0.9676
5	$\ln c = -0.0006t + 2.1952$	0.0006	6	0.8929
6	$\ln c = -0.0082t + 2.4138$	0.0082	82	0.9984
7	$\ln c = -0.0220t + 2.4056$	0.0220	220	0.9477
8	$\ln c = -0.0181t + 2.3309$	0.0181	181	0.9561
9	$\ln c = -0.0051t + 2.2314$	0.0051	51	0.9662

2.4 温度对反应速率的影响

反应温度对高锰酸钾氧化三氯生效果的影响见图 5 和表 3.不同反应温度下, $\ln(c/c_0)$ 与温度 θ 的关系曲线经拟合得到各温度下反应的假一级反应速率常数 K_{obs} 值.由图 5 可以看出,高锰酸钾氧化三氯生的反应速率随着反应温度的增加而增加.反应温度升高使反应物分子平均动能增大,分子间的碰撞次数也随之增多,同时反应温度升高会使更多的分子变为活化分子,增大了活化分子的百分率,这使得单位时间内有效碰撞次数增多,导致反应速率加快^[13].

根据反应速率常数与温度关系的 Arrhenius 方程,做不同温度下 $\ln K$ 与 θ^{-1} 关系曲线,可以求得表观活化能^[14],如图 6 所示.表观活化能 E 为

$32.35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,一般化学反应的活化能为 $60 \sim 250 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,而高锰酸钾氧化三氯生的表观活化能只有 $32.35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,略低于一般反应,说明该反应比较容易发生,反应速率比较快.

图 5 不同温度条件下高锰酸钾氧化三氯生拟合曲线

表 3 不同温度条件下高锰酸钾氧化三氯生反应动力学参数

温度/ $^{\circ}\text{C}$	拟合方程	$K_{\text{obs}}/\text{s}^{-1}$	$K/(\text{L} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	R^2
4	$\ln c = -0.0127t + 0.0792$	0.0127	127	0.98873
21	$\ln c = -0.0300t + 0.0981$	0.0300	300	0.98702
28	$\ln c = -0.0351t + 0.1081$	0.0351	351	0.99372
31	$\ln c = -0.0514t + 0.0534$	0.0514	514	0.99891

图 6 温度与 $\ln K$ 关系曲线

3 结 论

1) 三氯生可被高锰酸钾迅速氧化,高锰酸钾浓度为 $200 \mu\text{mol/L}$,氧化时间为 50 s 时,出水三氯生的浓度低于检测限.

2) 在高锰酸钾过量的情况下,其反应为二级动力学反应.高锰酸钾浓度和假一级反应动力学常数 K_{obs} 存在线性关系,拟合方程为 $K_{\text{obs}} = 0.0003316[\text{KMnO}_4] - 0.00792$ ($R^2 = 0.9861$),得出二级反应动力学常数 $K = 0.0003316 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

3) pH 值对反应速率有显著影响, pH < 5 时 K 较小, 反应速度较慢; pH 为 5~7 时, K 迅速增大, 当 pH 值为 7 时达到最大, $K = 588 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; pH > 7 后, K 减小, 反应速率降低.

4) 高锰酸钾氧化三氯生的反应速率随着反应温度的增加而增加. 用 Arrhenius 公式拟合得到反应的表观活化能为 $32.35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 说明该反应在一般水处理条件下比较容易发生, 反应速率比较快.

参考文献:

- [1] ZHANG Huichun, HUANG Chinghua. Oxidative transformation of triclosan and chlorophene by manganese oxides [J]. *Environmental Science & Technology*, 2003, 37(11): 2421-2430.
- [2] 周世兵, 周雪飞, 张亚雷, 等. 三氯生在水环境中的存在行为及迁移转化规律研究进展[J]. *环境污染与防治*, 2008, 30(10): 71-75.
- [3] ZHAO Jianliang, YING Guangguo, LIU Yousheng. Occurrence and risks of triclosan and triclocarban in the Pearl River system, South China: from source to the receiving environment [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2010, 179: 215-222.
- [4] MILLER T, HEIDLER J, CHILLRUD S, *et al.* Fate of triclosan and evidence for reductive dechlorination of triclocarban in estuarine sediments [J]. *Environmental Science & Technology*, 2008, 42(12): 4570-4576.
- [5] JIANG Jin, PANG Suyan, MA Jun. Oxidation of triclosan by permanganate (Mn(VII)): importance of ligands and in situ formed manganese oxides[J]. *Environmental Science & Technology*, 2009, 43(21): 8326-8331.
- [6] BUTH J, STEEN P, SUEPER C. Dioxin photoproducts of triclosan and its chlorinated derivatives in sediment cores [J]. *Environmental Science & Technology*, 2010, 44(12): 4545-4551.
- [7] FISS E, RULE K, VIKESLAND P. Formation of chloroform and other chlorinated byproducts by chlorination of triclosan-containing products[J]. *Environmental Science & Technology*, 2007, 41(7): 2387-2394.
- [8] 马军, 李圭白, 陈忠林, 等. 高锰酸钾除微污染效能-GC/MS 分析[J]. *中国给水排水*, 1999(5): 13-17.
- [9] 马军, 李圭白, 李晓东. 高锰酸钾的氧化助凝效能[J]. *中国给水排水*, 1992, 8(4): 4-9.
- [10] 杨开, 李春森, 莫孝翠, 等. 高锰酸钾氧化法去除地表水中的锰[J]. *中国给水排水*, 2003, 19(8): 61-62.
- [11] 刘尧, 张晓健, 戴吉胜, 等. 高锰酸钾氧化水中乙硫醇的动力学研究[J]. *环境科学*, 2008, 29(5): 1261-1265.
- [12] 李圭白, 杨艳玲, 马军, 等. 高锰酸钾去除天然水中微量有机污染物机理探讨[J]. *大连铁道学院学报*, 2003, 19(8): 61-62.
- [13] 任广军, 翟玉春, 田彦文, 等. 用高锰酸钠氧化法去除水中的苯胺[J]. *东北大学学报: 自然科学版*, 1998, 19(2): 1-4.
- [14] NAIK P, CHIMATADAR S, NANDIBEWOOR S. Kinetics and oxidation of fluoroquinolone antibacterial agent, norfloxacin, by alkaline permanganate: a mechanistic study [J]. *Ind Eng Chem Res*, 2009, 48(5): 2548-2555.

(编辑 魏希柱)