牦牛 κ -酪蛋白新遗传变异体及进化分析

崔艳华¹, 曲晓军², 董爱军¹, 马 莺¹

(1. 哈尔滨工业大学 食品科学与工程学院, 150090 哈尔滨, maying@hit.edu.cn; 2. 黑龙江省科学院 微生物研究所, 150010 哈尔滨)

摘 要: 为明确牦牛乳中 κ -酪蛋白中遗传多样性, 以 κ -酪蛋白基因 (*CSN3*) 的 IV 外显子为研究对象, 采用 PCR-RFLP 方法对麦洼牦牛的 *CSN3* 进行分析, 旨在从分子水平揭示 κ -酪蛋白在牦牛乳中遗传多样性分布. 并以 *CSN3* 的 IV 外显子序列建立牛属 κ -酪蛋白的系统发育树, 从而分析进化关系. 结果表明, 牦牛乳中 κ -酪蛋白多数以纯合体形式存在, 并发现了一个新的变异体 GU441771. 牛属 *CSN3* 的系统发育树分析表明, κ -酪蛋白在进化上存在一定的物种特异性.

关键词: 牦牛乳; κ -酪蛋白; 遗传多样性; 聚合酶链式反应-限制性片段长度多态性

中图分类号: Q52 **文献标志码:** A **文章编号:** 0367-6234(2012)02-0120-04

The new variant and phylogenetic analysis of the κ -Casein Gene (*CSN3*) in yak

CUI Yan-hua¹, QU Xiao-jun², DONG Ai-jun¹, MA Ying¹

(1. School of Food Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, 150090 Harbin, China, maying@hit.edu.cn; 2. Institute of Microbiology, Heilongjiang Science Academy, 150010 Harbin, China)

Abstract: A polymorphism of κ -casein gene *CSN3* exon IV was identified in Chinese Maiwa Yak by PCR-restriction fragment length polymorphism protocol to reveal the distribution of diversity of κ -casein in Maiwa Yak at the DNA sequence level. The sequences corresponding to the coding region of κ -casein gene exon IV were used for phylogenetic analysis to establish the phylogenetic relationship of *CSN3* variants in the *Bos* genus. Experimental results indicated that most yak milks were with κ -casein BB genotype. A new variant was identified in Maiwa yak breed by analysis and entered into GenBank with accession number GU441771. The phylogenetic analysis presented κ -casein evolution was consistent with species at a degree.

Key words: yak milk; κ -Casein; polymorphism; polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism

酪蛋白是乳蛋白的主要成分, 约占总蛋白的 76% ~ 86%, 主要包括 α_{s1} -酪蛋白 (α_{s1} -CN)、 α_{s2} -酪蛋白 (α_{s2} -CN)、 β -酪蛋白 (β -CN) 和 κ -酪蛋白 (κ -CN)^[1-2]. 由于氨基酸的置换或缺失、磷酸化位点不同、糖基化差异等造成牛乳酪蛋白存在着遗传变异体, 呈现不同的遗传多态性. 研究表明, 某些乳蛋白遗传变异体与产乳量、乳组成、干酪产

量等重要性状密切相关, 因此, 酪蛋白多样性的研究引起广泛关注^[1-3].

κ -CN 决定酪蛋白胶束的形成和稳定, 并决定其大小和功能^[4], 同时具有抗菌活性、增加消化率等重要的生理学功能^[5]. 至今已在家牛乳蛋白中发现了 15 个变异体, 其中包括 A、B、C、E、F¹、F²、G¹、G²、H、I、A¹、J 等 12 个已命名变异体和 3 个未命名的变异体 (AJ619772, EU595507, EU595512)^[1-2]. 同时, 在牦牛和大额牛中分别发现了 4 个和 1 个变异体^[6-9]. κ -CN 基因 (*CSN3*) 全长 13 kb, 包括 5 个外显子和 4 个内含子, 变异

收稿日期: 2011-02-12.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (30871953; 31071571).

作者简介: 崔艳华 (1978—), 女, 博士, 副教授;

马 莺 (1961—), 女, 教授, 博士生导师.

体之间的差异主要分布于外显子IV中.本研究以CSN3的IV外显子和部分IV内含子区域为扩增对象,采用PCR-RELP(Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism)方法分析了牦牛乳CSN3的遗传多样性,发现了一个新变异体.采用生物信息学方法对现有 κ -CN变异体进行分析,建立系统发育树,旨在揭示其多样性的分布及进化.

1 试验

1.1 牦牛乳

38份牦牛乳取自四川麦洼牦牛,取样后加入叠氮化钠(NaN_3 , 0.4 g/L)防止蛋白沉淀,存于 $-20\text{ }^\circ\text{C}$.

1.2 试剂

蔗糖、Tris碱、盐酸、氯化镁、Triton-X-100、氯化钠、乙二胺四乙酸二钠盐、异丙醇、无水乙醇等均均为分析纯,购自北京试剂公司.蛋白酶K购自TAKARA公司.KOD-Plus-DNA聚合酶、Target cloneTM-plus kit购自东洋纺(上海)生物科技有限公司.引物由上海生工合成.限制性内切酶购自MBI Fermentas公司.

1.3 主要仪器

高速冷冻离心机(Biofuge Stratos, Heraeus)、电泳仪(BioRad)、凝胶成像系统(BioRad)、PCR仪(TAKARA公司).

1.4 牦牛乳DNA的提取

采用常规离心法提取牦牛乳中体细胞.以乳体细胞为材料,提取牦牛基因组DNA,方法见文献[10].

1.5 引物以及PCR-RFLP

根据牛 κ -酪蛋白的IV外显子和部分IV内含子区域设计引物 κ -F(5'-CGCTGTGAGAAAGATGAAAGATTC-3')和 κ -R(5'-GATTCAAGGAGTATACCAATTGTTG-3'),预期产物片段大小为780 bp,对应位置为CSN3基因的4930至5708区域(NCBI序列号X14908)^[7, 11].

以提取的牦牛基因组DNA为模板,以 κ -F和 κ -R为引物扩增 κ -酪蛋白的IV外显子和部分IV内含子区域.PCR反应程序为 $94\text{ }^\circ\text{C}$ 2 min预变性,然后以 $94\text{ }^\circ\text{C}$ 15 s, $53\text{ }^\circ\text{C}$ 30 s, $68\text{ }^\circ\text{C}$ 45 s为一个循环,共进行30个循环,之后 $68\text{ }^\circ\text{C}$ 延伸7 min, $4\text{ }^\circ\text{C}$ 保存.PCR反应体系为:10×PCR buffer 2 μL , dNTPs (2.5 mmol/L) 2 μL , MgCl_2 (25 mmol/L) 0.8 μL ,上下游引物(10 $\mu\text{mol/L}$)各1 μL , KOD-Plus-DNA聚合酶2 U, DNA 10~50 ng,用双蒸水

补足体积至20 μL .

5 μL 的PCR产物用于PCR-RFLP分析.将PCR产物分别与5 U限制性内切酶Hind III、Hpa I和Pst I反应,反应条件参照说明书(MBI Fermentas).酶切产物以2.5%琼脂糖凝胶进行电泳检测.

1.6 克隆与测序

采用Target cloneTM-plus kit将PCR产物克隆到pTA2载体上.将筛选获得阳性克隆进行测序,正反向同时测序.获得的序列信息提交至GenBank,序列号为GU441771.

1.7 牛属酪蛋白序列与序列分析

κ -CN基因核酸序列来自NCBI数据库(www.ncbi.nlm.nih.gov),其中包括家牛(*Bos taurus*, *Bos indicus*)变异体A(X14908)、B(X14908)、E(AF041482)、F²²(AF123250)、G¹(AF123251)、H(AF105260)、I(AF121023)、A¹(AF092513)、AJ619772、EU595506、EU595507、EU595512,5个牦牛(*Bos grunniens*) κ -CN变异体(AF194989、EF565131、AY095311、AY095312和GU441771)和一个来源于大额牛(*Bos frontalis*) κ -酪蛋白变异体(EU595506).变异体C和J是以CSN3*B为基础根据Prinzenberg等^[6]的方法重新构建.变异体F¹和G²序列信息来自前人研究结果^[2, 12-13]. κ -CN外显子IV的序列用于构建系统进化分析.采用CLUSTAL X软件进行多重序列比对^[14].采用TREECON软件计算遗传距离,并建立系统发育树^[15].

2 结果与分析

2.1 牦牛乳 κ -CN遗传多样性分析

2.1.1 PCR扩增

以牦牛乳基因组DNA为模板,以引物 κ -F和 κ -R扩增 κ -酪蛋白基因的IV外显子和部分IV内含子区域,获得了约780 bp大小的片段(图1),与预期相符.

2.1.2 PCR-RFLP分析

对变异体A、B(X14908)、AF194989、EF565131、AF030326、AF030327、AY095311和AY095312序列进行限制性酶切位点分析.限制性酶切位点Hind III、Pst I和Hpa I用于PCR-RFLP分析.PCR-RFLP分析结果见图2.Hind III、Pst I和Hpa I酶切分析揭示牦牛乳样品呈现两种截然不同的带型,分别命名为AB和BB.利用Hind III酶切后,AB型含有3条带,即780、400、360 bp;BB型含有两条带,即350和400 bp.以Pst I和Hpa I酶切后也呈现两种带型(见图2).

1—Marker DL2000 plus; 2~6—1~5 牦牛乳样品 PCR 产物;
7—水空白对照。

图1 牦牛 κ -酪蛋白基因的 IV 外显子和部分 IV 内含子区域 PCR 分析

1—Marker; 2, 3—PCR 产物; 4, 5—PCR 产物/*Hind* III;
6, 7—PCR 产物/*Pst* I; 8—Marker. 2, 4, 6—AB 型; 3, 5, 7—BB 型。
(a) 牦牛 κ -酪蛋白的 PCR 产物 *Hind* III 与 *Pst* I 酶切分析

1—Marker; 2—AB 型 PCR 产物/*Hpa* I; 3—BB 型 PCR 产物/*Hpa* I;
4—Marker。

(b) 牦牛 κ -酪蛋白的 PCR 产物 *Hpa* I 酶切分析

1—Marker DL2000 plus; 2~6—1~5 牦牛乳样品 PCR 产物; 7—Marker。

图2 牦牛 κ -酪蛋白的 PCR-RFLP 分析

在 38 个牦牛乳样品中, 仅有一个样品为 AB 型, 其余为 BB 型, 出现的频率分别为 2.63% 和

97.37%。杂合样品的频率很低, 这些结果与前人结果一致^[7, 9]。Bai 等^[9]在对九龙、麦洼、大龙牦牛研究中未发现杂合的 κ -CN。Fan 等^[9]对来自青海的 60 个牦牛乳样品研究中, 仅仅发现了 1 个杂合型 κ -CN 乳样。前人研究表明, κ -CN BB 型牛乳与 AA 和 AB 型相比, 因为含有较小的酪蛋白胶束, 凝乳时间短, 形成的凝块更均一, 可提高干酪的产量, 更适合用于乳品生产^[16-17]。在牦牛乳中, κ -CN BB 型占优势, 可能有利于牦牛乳的加工。

2.1.3 克隆与测序

将上述通过 PCR-RFLP 方法获得的两种类型 PCR 产物分别克隆到载体 pTA2 上, 筛选阳性质粒, 进行测序。BB 型序列与 AY095311 一致, 这种变异体曾在来自甘肃省的甘南牦牛中检测到^[6]。Prinzenberg 等^[6]也报道了另一个 CN3 外显子 IV 序列 AY095312, 但在本研究未获得该序列。

AB 型的 12 个阳性克隆被测序。该样品为杂合, 获得两种序列, 一个等同于 AY095311, 而另一个序列不同于任何一个已知牛属 *CSN3* 变异体。其序列提交至 NCBI, 获得序列编号为 GU441771。该变异体在九龙、大龙、天祝白、甘南和青海品种牦牛中未发现^[6-7, 9]。

2.2 牛属 κ -CN 遗传多样性和进化分析

对来自牛属包括 *Bos taurus*、*Bos indicus*、*Bos frontalis* 和 *Bos grunniens* 的 κ -CN 外显子 IV 的序列进行聚类分析, 建立系统发育树, 以来自山羊的 κ -CN 基因 (*CSN3*) 外显子 IV 的序列 (AY090465) 作为参比。研究表明, 可划分为 5 个分支, 其中包括 1 个山羊 κ -CN 基因序列 (即 V 组) 和 4 个主要序列分支 (I-IV 组) (见图 3)。第 I 组包括变异体 *CSN3 * A, E, F¹, F², G¹, G², H, A¹* 和 AJ619772。其中 *CSN3 * E, F¹, F², G², H, A¹* 和 AJ619772 与变异体 *CSN3 * A* 仅仅相差 1 个碱基。因此, 推测以上变异体直接由 *CSN3 * A* 进化而来。*CSN3 * G¹* 与 *CSN3 * A* 相差两个碱基, 而与 *CSN3 * H* 仅仅相差 1 个碱基。因此, 推测 *CSN3 * G¹* 是由 *CSN3 * H* 进化而来的。

II 组可分为 3 个亚组。II-1 组包括 4 个家牛的序列, 即 *CSN3 * B, C, J* 和 EU595512。*CSN3 * C, J* 和 EU595512 与 *CSN3 * B* 相差 1 个碱基, 推测上述变异体由 *CSN3 * B* 进化而来。II-2 组由 4 个来自牦牛的序列组成, 即 AY095312、EF565131、AF194989 和 GU441771。这组序列与 II-1 组序列相比, 具有一个显著的差异, 即以 TGA 为终止密码子。这也显示了牦牛与家牛存在一定的差异。由于这个独特密码子的存在, 尽管本

研究发现的新的变异体 GU441771 与 CSN3 * A 的蛋白质序列相同,但是在核酸序列上 477 位置存在差异. EU595507 独立构成 II -3.

来自牦牛的 AY095311 和大额牛 (*Bos frontalis*) 的 EU595506 均独立各成一组. AY095311 含有 12 bp 的特有序列 CTTCTCCAGAAG.

图3 牛属 CSN3 IV 外显子序列的聚类图

3 结 语

采用 PCR-RFLP 方法,以 κ -酪蛋白基因 (CSN3) 的 IV 外显子为研究对象,对麦洼牦牛的 κ -酪蛋白基因进行分析. 结果发现,牦牛乳中 κ -酪蛋白呈现两种截然不同的带型,多数以纯合体形式存在. 并发现了一个新的变异体 GU441771,该变异体与 CSN3 * A 在蛋白水平上完全相同,但在核酸水平上存在一个碱基差异. 来自牛属包括 *Bos taurus*、*Bos indicus*、*Bos frontalis* 和 *Bos grunniens* 的 κ -酪蛋白基因的 IV 外显子序列系统发育分析表明, κ -酪蛋白在进化上存在一定的物种特异性.

参考文献:

[1] FARRELL H M, JIMENEZ-FLORES JR R, BLECK G T, *et al.* Nomenclature of the proteins of cows' milk-sixth revision [J]. J Dairy Sci, 2004, 87: 1641 - 1674.

[2] CAROLI A M, CHESSA S, ERHARDT G J. Milk protein polymorphisms in cattle: effect on animal breeding and human nutrition [J]. J Dairy Sci, 2009, 92: 5335 - 5352.

[3] 崔艳华, 马莺, 何胜华, 等. 牛乳酪蛋白多态性研究 [J]. 中国乳品工业, 2010, 38(5): 32 - 37.

[4] CREAMER L K, PLOWMAN J E, LIDDELL M J, *et al.* Micelle stability: kappa-casein structure and function [J]. J Dairy Sci, 1998, 81(11): 3004 - 3012.

[5] MALKOSKI M, DASHPER S G, O' BRIEN-SIMPSON N M, *et al.* Kappacin, a novel antibacterial peptide from bovine milk [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2001, 45: 2309 - 2315.

[6] PRINZENBERG E M, HAN J L, ERHARDT G. Genetic variation in the κ -casein gene (CSN3) of Chinese yak (*Bos grunniens*) and phylogenetic analysis of CSN3 sequences in the genus *Bos* [J]. J Dairy Sci, 2008, 91: 1198 - 1203.

[7] FAN B, LI N, HU X X, *et al.* Cloning, sequencing and polymorphism analyzing of the exon 4 of the kappa-casein gene in yak [J]. Prog Nat Sci, 2000, 10: 769 - 773.

[8] CHEN S Y, COSTA V, AZEVEDO M, *et al.* New alleles of the bovine kappa-casein gene revealed by resequencing and haplotype inference analysis [J]. J Dairy Sci, 2008, 91 (9): 3682 - 3686.

[9] BAI W L, YIN R H, ZHAO S J, *et al.* Characterization of a κ -Casein genetic variant in the Chinese yak, *Bos grunniens* [J]. J Dairy Sci, 2008, 91: 1204 - 1208.

[10] 崔艳华, 马莺, 曲晓军, 等. 牦牛乳中 DNA 提取方法的建立与优化 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2011, 43(2): 1892 - 1895.

[11] ALEXANDER L J, STEWART A F, MACKINLAY A G, *et al.* Isolation and characterization of the bovine kappa-casein gene [J]. Eur J Biochem, 1988, 178 (2): 395 - 401.

[12] SULIMOVA G E, SOKOLOVA S S, SEMIKOZOVA O P, *et al.* Analysis of DNA polymorphisms of clustered genes in cattle: casein genes and genes of the major histocompatibility complex (BOLA) [J]. Tsitologičai Genetika, 1992, 26: 18 - 26.

[13] SULIMOVA G E, BADAGUEVA I N, UDINA I G. Polymorphism of the κ -casein gene in subfamilies of the Bovidae [J]. Genetika (Moskva), 1996, 32: 1576 - 1582.

[14] THOMPSON J D, GIBSON T J, PLEWNIAC F, *et al.* 1997 The clustalx windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools [J]. Nucl Acids Res, 1997, 24: 4876 - 4882.

[15] PEER van der Y, WACHTER de R. TREECON for windows: a software package for construction and drawing of evolutionary trees for the microsoft windows environment [J]. Comput Appl Biosci, 1994, 10: 569 - 570.

[16] DI STASIO L, MARIANI P. The role of protein polymorphism in the genetic improvement of milk production [J]. Zootecnica Nutrizione Animale, 2000, 26: 69 - 90.

[17] GASTALDI E, TRIAL N, GUILLAUME C, *et al.* Effect of controlled κ -casein hydrolysis on rheological properties of acid milk gels [J]. J Dairy Sci, 2003, 86: 704 - 711.